KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové,
Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: [redacted], ID datové schránky: qk4aiki

NAŘÍZENÍ
Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj
č.02/2011.

Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj (dále i jen KVSH) jako místně a věcně příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen veterinární zákon) v souladu s § 15 a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 nařizuje podle § 49 odst. 1 písm. c) téhož zákona **tato**

mimořádná veterinární opatření
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy

varroázy včel
v chovech včel na katastrálních územích regionu Královéhradeckého kraje.

ODDÍL I

Článek 1
Základní ustanovení.

Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel ve všech katastrálních územích Královéhradeckého kraje, organizované i neorganizované v Českém svazu včelařů, o.s. (dále jen ČSV).

Článek 2
Poučení o nákaze.

Varroáza včel je nebezpečná nákaza způsobená roztočem Varroa destructor.
Roztoč napadá včelí plod - nejčastěji trubčí, na kterém se rozmnožuje a rovněž dospělé včely. Roztoč může být přenašečem virových, bakteriálních a plísňových onemocnění včel a včelího plodu.
Nákaza se šíří nakaženými trubci, včelami, roji a loupežením zdravých včel v nemocných včelstvech.
Pokud není včelstvo léčeno účinnými prostředky, způsobuje roztoč úhyn včelstva.

Článek 3
Diagnostika.

Diagnóza se stanoví na základě:
a) laboratorního vyšetření spadu, měli a včel,
b) klinického vyšetření zejména zavíčkovaného trubčího plodu.

Článek 4
Léčebné ošetřování včelstev.

1. **Odstranění roztočů v ohniscích nákazy** při zjištění nadlimitního počtu roztočů ve vzorcích zimní měli, tj. při nálezu více než 3 samiček roztoče Varroa destruktor v průměru na 1 včelstvo se použije emulze přípravku *M-1 AER 240 mg/ml koncentrát* k nátěru víček plodu (najednou ne větší plochu než 10 dm^2) spojené s fumigací přípravkem *VARIDOL 125 mg/ml roztok*. Léčebné ošetření včelstev musí být provedeno **každoročně nejpozději do 15. dubna.**

2. **Omezování populace roztočů při nižší intenzitě varroázy v plodovém období** pozdního jara a celého léta při venkovních teplotách nad 20 °C použitím přípravku *FORMIDOL destičky a.u.v.* s kyselinou mravenčí. Přípravek nezanechává rezidua v medu ani vosku a kromě varroázy je účinný i na spory prvoka Nosema apis a v oblastech s výskytem zvápenatění plodu jeho použití nutí včelstva k odvíčkování napadených buněk a včasné odstranění nemocných kukel.
Techniku aplikace přípravku je třeba vyzkoušet a zvládnout, aby se neprojevily některé jeho negativní vedlejší účinky.

3. **Ochrana plodu zimující generace** a současně i ochrana před reinvazí roztočů v podletí = v období měsíců červenec až srpen, co nejdříve po posledním odběru medu (medobraní) použitím přípravků: *GABON PA92 proužky do úlu* (resp. *GABON PA 1.5 mg proužky do úlu ke klinickému hodnocení)* nebo *GABON PF90 proužky do úlu.*

4. **Omezení populace roztočů v bezplodovém období** pozdního podzimu a zimy (měsíce říjen až prosinec): opakované (3x) ošetření fumigací v doporučeném intervalu 14 - 21 dnů přípravkem *VARIDOL 125 mg/ml roztok* (nebo *MP 10 FUM a.u.v.*) při venkovní teplotě nad + 10°C. **Při 2. a 3. ošetření nesmí být ve včelstvu zavíčkovaný plod.** Při poklesu venkovních teplot (až do - 5°C) je možné nahradit 3. ošetření fumigací aplikací přípravku *VARIDOL 125 mg/ml roztok* (nebo *M-1 AER 240 mg/ml koncentrát*) ve formě aerosolu (vodní emulze nebo acetonový roztok) s pomocí speciálního vyvíječe aerosolu.